

KUJTON!!!

MASA TERAPEUTIKE
Vetëdijesim përfundim i sëmundjeve
të së nxehitit, manifestimi i saj
klinik (fotografi), diagnoza dhe mjekimi
(trajtim);

1

Mekanizmat e të krijuarit të sëmundjes të së nxehitit, manifestimi i saj klinik (fotografi), diagnoza dhe mjekimi (trajtim);

2

Njohja e shenjave të hershme të goditjes të së nxehitit;

3

Ndërmarrja e masave përkatëse përfshirje dhe resuscitacion; përsimptome të hershme dhe trajtim jashtë spitalor, shikoni pjesën informative përcirkim të goditjes të së nxehitit dhe sëmundje tjetra të lehta të së nxehtit;

4

Njohja e pacientëve të rezikshëm dhe edukim përkatës për sjellje ndaj personë të dobët, si dhe foshnjave poashtu është e rëndësishme;

5

Këshilla për personë me sëmundje kronike (të shmangunit nga eksponimi në të ngrohtë, konsumimi i lëngjeve në mënyrë përkatëse, marra e barnave);

S.O.S. NUMËR FALAS PËR INFORMIM PËR MBROJTIJE NGA VALËT E SË NXEHTIT
02 32 21 902 (10 - 18H)

Përbajtja dhe përpunimi i materialit informativ është e përkrahur nga Organizata botërore e shëndetësisë, Zyra në Shkup

AMBULANCA

6

Vetëdijesim përfekte të mundëshme të padashura nga barnat e shkruara dhe adaptimi i dozës;

EDUKONI, KËSHILLONI DHE INFORMONI PACIENTËT PËR:

1

Rëndësinë e përbajtjes ndaj rekondimeve të dhëna në materialet edukative për populsinë e përgjithshme;

2

Marra e barnave dhe lëngjeve në pajtueshmëri me rekondimet e mjekut;

3

Për informata më të detajuarë ti kontaktojnë shërbimet medicinale dhe sociale, linjat për ndihmë dhe shërbimet urgjente medicinale;



SI KUNDËR VALES TË SË NXEHTIT?

Rekomandime përmjekët amë



MINISTRIA E SHËNDËTESISË



Instituti i Shëndetit Publik të RM



Црвен крст на Република Македонија
Крugi i kuq i Republikës së Maqedonisë
Macedonian Red Cross

INFORMACIONI NGA I NXHETIT

INFORMATA PËR SËMUNDJE TË BUTË DHE TË MATUR TË SË NXEHTIT

GYENDJE MEDICINALE

■ SKUQJE E TË SË NXEHTIT (RASH)



■ EDEMI TË SË NXEHTIT



SINKOPA E TË SË NXEHTIT



■ SHTERRJA NGA I NXEHTI



SHENJA DHE SIMPTOME/ MEKANIZMA

Papula të vogla të kuqe, të krojturit e fytyrës, qafës, pjesa e sipërme e gjoksits, nën gjitë, ijet dhe pjesa e Scrotumit. Ndikon tek të gjitha moshat por më të shpeshta janë tek fémijet e vegjël. Mund të paraqitet infekzioni me stafilokok. Është pasojë e zmadhimit të djersit të gjatë kohës të nxehët dhe me lagështi.

Edemi posaçerisht i ekstremiteteve të poshtme, më shpesh të nyjeve paraqitet në fillim të sezonës të së nxehëtit. Është pasojë e vazodilatacioni periferik i shkaktuar nga i nxehti dhe ndalimi i ujit dhe kripës.

Humbja e vëtëdijes për rje kohë të shkurtër ose marramendje ortostatike. Është e zakonshme tek personët me sëmundje kardiovaskulare ose personë të cilët konsumojnë diuretikë edhe atë në periudhë para aklimatizimit. Është pasojë e dehidracionit, vazodilatimit periferik dhe rikthim venoz të zgogjëtar dhe rezulton më autput të zgogjëtar të zemrës.

Ngërçitjet e së nxehëtit mund të jetë normalë, subnormale ose lehtë e hipur (më e vogël se 40°C). Pulsi është i dobët me hipotension postular dhe frysma e cekët. Nuk ka ndryshim të gjendjes mentale. Është pasojë e shterries të ujit trupor dhe /ose kripës që është rezultat i eksponimit në temperaturë të lartë, nxehësia të lartë ose shterje.

MASA TERAPEUTIKE

Skuqja tērhiqet pa ndonjë trajtim specifik. Vendosni pacientin në hapsirë me pajisje klimë. Me qëllim të minimizimit të djersit, rekombinohet larja e shpeshtë dhe veshja me ngjyrë të hapura. Rekomandohet që vendi i skuqur të mbahet i thatë. Lokalisht mund të përdoren antihistaminikë dhe antisepikë që të zgogjëhet pakëndshmëria dhe mundësia përfshikim sekundar.

Trajtimi nuk është i nevojshëm, edemi më së shpeshti tērhiqet me aklimatizim. Nuk rekombinohen diuretikë.

Vendosni pacientin në vend të ftohtë.

Vendosni pacientin në pozitë të shpinës dhe ngrini këmbët dhe kërdhokullat që të zmadhohet kthimi venoz.

Shkyçni arsyet tjera serioze përfshikim sekundar.

Vendosni pacientin në vend të ftohtë. Térheqja muskulore dhe masazhë të ndjishme.

Rehidratacion oral me tretje e cila përmban elektrolite.

Ndihmë medicinë duhet të kerkohet nëse ngërçet e të nxehët zgasin më tepër prej një ore.

Çvendosni pacientin në hje të ftohtë ose dhomë me pajisje klimë. Çvesheni pacientin, mbuloni me çarshafë të ftohtë dhe të lagët ose stërpikni me ujë të ftohtë dhe nëse është e mundësime edhe të ventilohej. Pacienti të jetë i shtrirë me këmbët dhe kërdhokullat e ngritura që të përmirësohet kthimi venoz. Filloni hidratacion oral. Nëse nausea pengon hyrjen orale atëherë filloni rehidratacion venoz.

Nëse hipertermija është mbi 39 gradë oC, OSE gjendje e çregjulluar mentale, OSE paraqitet hypotension constant mjejkoheni sikur me qenë goditje e së nxehët dhe bartni në spital.